

## 意見書

(「保育所における感染症対策ガイドライン」「厚生労働省感染症・予防接種情報」より引用)

病名	主な症状	予防接種	登所のめやす
麻疹 (はしか)	高熱と同時に発疹後、ほほの内側に白い斑点(コプリック斑)	有	解熱した後3日を経過するまで
インフルエンザ	突然の発熱・だるさ 関節痛・頭痛・のどの痛み・鼻水・咳	有	発症後最低5日間且つ解熱した後、 幼児は3日を経過するまで
風疹 (三日はしか)	淡紅色の発疹 リンパ節の腫れ	有	発疹が消失するまで
水痘 (みずぼうそう)	発疹は紅斑から丘疹、水泡、痂皮の順に変化する	有	すべての発疹が痂皮化するまで
流行性耳下腺炎 (ムンプス・おたふくかぜ)	発熱、耳の下の腫れと痛み	有	腫れが発現した後5日間を経過し、 かつ全身状態が良好となるまで
結核	発熱・咳・呼吸困難 チアノーゼ	有	医師により感染の恐れがなくなったと認められるまで
咽頭結膜熱 (プール熱・アデノウイルス感染症)	39℃前後の発熱 のどの痛み・目の充血	無	主な症状が消失し、2日を経過するまで
流行性角結膜炎 (はやり目)	流涙・白眼の充血・目やにまぶたの腫れ	無	医師が感染の恐れがないと認めるまで (症状が消失してから)
百日咳	のどの痛み・鼻水・咳から次第に咳が強くなり 1~2週間で特有な咳	有	特有な咳が消失するまで 5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
腸管出血性大腸菌感染症 (O-157、O-26、O-111)	激しい腹痛・頻回の水様便・血便 発熱は軽度	無	症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便で、いずれも菌の陰性が確認できること
急性出血性結膜炎	急性結膜炎で、目の充血・目の痛み・目やに 結膜出血	無	医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 (侵襲性髄膜炎菌感染症)	頭痛・発熱・けいれん 意識障害・点状出血・関節炎	有	医師が感染の恐れがないと認めるまで

## 意見書

ケヤキッズ保育園・ベビールーム・スマイルルーム園長宛

入園児童名 \_\_\_\_\_

病名 \_\_\_\_\_ と診断され、

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日から病状が回復し、集団生活に支障がない状態になったので

登園可能と判断します。

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

医療機関名

医師名

印 又はサイン